

Cuadro 5
Índice de actividad de la enfermedad de Crohn en niños (PCDAI)*

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|-----|
| 1. Historia clínica (recuerdo de una semana) | | | | |
| <i>Dolor abdominal</i> | | | | |
| Ninguno | | | | 0 |
| Leve, de corta duración, no interfiere con la actividad normal | | | | 5 |
| Intenso, de larga duración, afecta la actividad normal, nocturno | | | | 10 |
| <i>Deposiciones (por día)</i> | | | | |
| 0-1 deposiciones líquidas, son ausencia de sangre | | | | 0 |
| Hasta 2 deposiciones semi-blandas con sangre, o 2-5 deposiciones líquidas | | | | 5 |
| Sangrado abundante o > deposiciones líquidas o diarrea nocturna | | | | 10 |
| <i>Estado general y capacidad funcional</i> | | | | |
| Bueno. Actividad no limitada | | | | 0 |
| Regular. Dificultades ocasionales para mantener las actividades habituales | | | | 5 |
| Muy deficiente. Limitaciones frecuentes de las actividades. | | | | 10 |
| 2. Analítica | | | | |
| <i>Velocidad de sedimentación globular (en mmm/h)</i> | | | | |
| < 20 | | | | 0 |
| 20-50 | | | | 2.5 |
| > 50 | | | | 5 |
| <i>Albúmina (g/l)</i> | | | | |
| > 35 | | | | |
| 31-34 | | | | 5 |
| < 30 | | | | 10 |
| <i>Hematócrito (%)</i> | | | | |
| < 10 años | Varón 11-14 años | Varón 15-19 años | Mujer 11-19 años | |
| > 33 | >35 | >37 | >34 | 0 |
| 28-32 | 30-34 | 32-36 | 29-33 | 2-5 |
| < 28 | >30 | <32 | <29 | 5 |
| 3. Exploración | | | | |
| <i>Peso</i> | | | | |
| Aumento de peso, peso estable voluntario o adelgazamiento | | | | 0 |
| Peso estable involuntario, adelgazamiento de 1 a 9% | | | | 5 |
| Adelgazamiento > 10 % | | | | 10 |
| <i>Abdomen</i> | | | | |
| No se observan masas abdominales ni dolor con la palpación | | | | 0 |
| Dolor con la palpación o masas abdominales sin dolor con la palpación | | | | 5 |
| Dolor con la palpación, contractura abdominal o masa abdominal definida | | | | 10 |
| <i>Talla (completar sólo al diagnóstico)</i> | | | | |
| Disminución de menos de una escala* (* 1 escala = 2 percentiles) | | | | 0 |
| Disminución de 1 a 2 escalas | | | | 5 |
| Disminución de mas de 2 escalas | | | | 10 |
| <i>Talla (completar sólo durante el seguimiento)</i> | | | | |
| Velocidad de crecimiento > - 1 DE | | | | 0 |
| Velocidad de crecimiento < - 1 DE o > - 2DE | | | | 5 |
| Velocidad de crecimiento > - 2 DE | | | | 10 |
| <i>Enfermedad perirrectal</i> | | | | |
| No. Colgajos o papilomas cutáneos asintomáticos | | | | 0 |
| 1-2 fístulas indoloras, drenaje, sin dolor con la palpación | | | | 5 |
| Fístulas activas, drenaje, dolor con la palpación o absceso | | | | 10 |
| <i>Manifestaciones extraintestinales</i> | | | | |
| No | | | | 0 |
| 1 | | | | 5 |
| 2 ó mas | | | | 10 |
| PCDAI Puntuación total (0 a 100) | | | | |

PCDAI > 30: Enfermedad moderada o grave PCDAI > 11 y < 30 : Enfermedad leve PCDAI < 10 Remisión clínica

* Tomado de Hyams JS, Ferry GD, Mandel FS, *et al.* ⁴⁰