

**Cuadro 1**  
**Malformaciones congénitas asociadas con trisomía 13\***

Características	Trisomía 13 (%)
<b>Malformaciones craneofaciales</b>	
Microcefalia	>50
Plagicefalia	Rara
Hendidura labial	60-80
Hendiduras palatinas	60-80
Anoftalmia	< 50
Microoftalmia	< 50
Micrognatia	Rara
Aplasia cutis	< 50
<b>Malformaciones cardiovasculares</b>	
Persistencia de conducto arterioso	80
Defectos del septo ventricular	80
Defectos del septo atrial	80
Dextrocardia	24
<b>Malformaciones abdominales</b>	
Onfalocele	Poco frecuente
Hernias umbilicales	67
Arteria umbilical única	40
Hernia inguinal	40
Diastasis de rectos	Poco frecuente
<b>Malformaciones genito-urinarias</b>	
Criptorquidia	100
Hidronefrosis	25
Útero bicorne	12
Riñón poliquístico	70
Duplicación de uréteres	12
<b>Malformaciones musculoesqueléticas</b>	
Polidactilia postaxial	76
Pliegue palmar único	64
Ectrodactilia	Rara
Oligodactilia	Rara
Talipes	89
<b>Malformaciones del sistema nervioso central</b>	
Holoprosencefalia	70
Convulsiones	25
Apnea	58

\* Modificado de Gorlin *et al.*<sup>6</sup>