




Versión español



English version



CrossMark



ACCESO ABIERTO

Citación: Corrección: Adherencia a la terapia hormonal en mujeres con cáncer de mama: un estudio transversal en Medellín, Colombia. Colomb Méd (Cali), 2025; 56(3):e9007103 <http://doi.org/10.25100/cm.v56i3.7103>

Copyright: © 2025 Universidad del Valle



CORRECCIÓN

Corrección: Adherencia a la terapia hormonal en mujeres con cáncer de mama: un estudio transversal en Medellín, Colombia

Correction: Adherence with hormonal therapy in women with breast cancer: a cross-sectional study in Medellin, Colombia

Correction associated to article: <https://colombiamedica.univalle.edu.co/index.php/comedica/article/view/2025-06-16>

Después de la publicación, el autor original de la escala de medición utilizada en el estudio, el Dr. Marty Morisky, ha comunicado que es necesario incluir referencias adicionales, un apartado de agradecimientos con sus datos de autoría e incluir el puntaje en la definición de los niveles de adherencia, tal como corresponde al uso adecuado de dicha escala.

En cumplimiento de la solicitud, el párrafo que señala:

“La variable de interés (dependiente) fue la adherencia terapéutica. Para medir la adherencia terapéutica, se aplicó la escala de adherencia de Morisky Green (MMAS-8) por medio telefónico, con el fin de detectar los comportamientos o las barreras que interfirieron con la adherencia a la terapia hormonal de cada participante; tras completar el diligenciamiento de la escala, de acuerdo con el puntaje, las pacientes se clasificaron en los niveles de alta, mediana y baja adherencia (5). Para el presente estudio, estos niveles se definieron de la siguiente forma:”

Con la modificación realizada, el párrafo queda de la siguiente forma:

“La variable de interés (dependiente) fue la adherencia terapéutica. Para medir la adherencia terapéutica, se aplicó la escala de adherencia de Morisky Green (MMAS-8) (5-8) por medio telefónico, con el fin de detectar los comportamientos o las barreras que interfirieron con la adherencia a la terapia hormonal de cada participante; tras completar el diligenciamiento de la escala, de acuerdo con el puntaje (de 0 a 8), las pacientes se clasificaron en alta (puntaje de 8), mediana (puntaje entre ≥ 6 y < 8) y baja (puntaje < 6) niveles de adherencia. Para el presente estudio, estos niveles se definieron de la siguiente forma:”

Asimismo, se añadió la declaración de agradecimientos, que no fue incluida en la versión original, quedando redactada de la siguiente manera:

Agradecimientos:

The MMAS-8 Scale, content, name, and trademarks are protected by US copyright and trademark laws. Permission for use of the scale and its coding is required. A license agreement is available from MMAR, LLC., www.moriskyscale.com.

Referencias adicionales para sustentar la escala MMAS-8

- Berlowitz DR, Foy CG, Kazis LE, Bolin L, Lonroy LB, Fitzpatrick P, et al. for the SPRINT Study Research Group. Impact of intensive blood pressure therapy on patient-reported outcomes results from the SPRINT study. N Engl J Med. 2017; 377:733-44. doi: 10.1056/NEJMoa1611179.
- Bress AP, Bellows BK, King JB, Hess R, Beddhu S, Zhang Z, et al. for the SPRINT Research Group and the SPRINT Economics and Health Related Quality of Life Subcommittee. Cost-effectiveness of intensive versus standard blood pressure control. N Engl J Med. 2017; 377: 745-55. doi: 10.1056/NEJMsa1616035.
- Adherence. The MMAS-8 Scale, content, name, and trademarks are protected by US copyright and trademark laws. Permission for use of the scale and its coding is required. A license agreement is available from MMAR, LLC. Available from: www.moriskyscale.com.